

# Regresión lineal con errores no normales: Secante Hiperbólica Generalizada

Álvaro Alexander Burbano Moreno<sup>1</sup> y Oscar Orlando Melo Martínez <sup>2</sup>

Recepción: 09-06-2014 | Aceptación: 23-07-2014 | En línea: 30-01-2015

MSC: 60E05, 62E10

doi:10.17230/ingciencia.11.21.2

---

## Resumen

En este trabajo se presenta un estudio del modelo de regresión lineal del tipo  $y = \theta x + e$ , donde el error tiene distribución Secante Hiperbólica Generalizada (SHG). El método para estimar los parámetros se obtienen mediante una configuración de máxima verosimilitud expresando las ecuaciones no lineales en forma lineal (Verosimilitud Modificada). Los estimadores resultantes son expresiones analíticas en términos de valores de la muestra y, por lo tanto, son fácilmente calculables. Mediante la aplicación de varios tipos de datos, se muestra la metodología descrita anterior, y se obtienen modelos plausibles frente a las verdaderas distribuciones subyacentes de los datos.

**Palabras clave:** distribución secante hiperbólica generalizada; modelo lineal clásico; máxima verosimilitud modificada; mínimos cuadrados

---

<sup>1</sup> Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, aaburbanom@unal.edu.co.

<sup>2</sup> Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, oomelom@unal.edu.co.

---

## Linear Regression with Errors not Normal: Generalized Hyperbolic Secant

---

### Abstract

This paper presents a study of the model of linear regression of the type  $y = \theta x + e$ , where the error has generalized hyperbolic secant distribution (GHS). The method to estimate the parameters are obtained by setting maximum likelihood expressing the non-linear equations in linear form (modified likelihood). The resulting estimators are analytical expressions in terms of values of the sample and, therefore, are easily calculables. Through the application of various types of data, the methodology described above is shown, and plausible models against the true underlying distributions of data are.

**Key words:** generalized secant hyperbolic distribution; classical linear model; modified maximum likelihood; least squares

---

## 1 Introducción

En un modelo de regresión lineal del tipo  $y = \theta x + e$ , a menudo se asume que los errores  $e_i$ ,  $1 \leq i \leq n$  son iid (independientes e idénticamente distribuidos) con distribución normal  $N(0, \sigma^2)$ . Sin embargo, hay muchas situaciones de la vida real en las cuales es evidente que la respuesta no es normal. Por ejemplo, existen aplicaciones donde la respuesta es binaria (0 o 1) y, por ello, su naturaleza es de Bernoulli. Otras veces, cuando la respuesta mide los tiempos de vida o los tiempos de reacción, los errores normalmente tienen una distribución sesgada. Por lo tanto, en este trabajo se asume que los  $e_i$  tienen una distribución Secante Hiperbólica Generalizada (SHG). Vaughan en el 2002 propuso esta familia de distribuciones [1]. Esta se compone de distribuciones simétricas tanto de cola corta y larga con curtosis que van desde 1.8 a 9 e incluye la logística como un caso particular, la uniforme como un caso límite y se aproxima estrechamente a las distribuciones normal y  $t$  de Student. Debido al amplio tipo de distribuciones que pueden ser consideradas, la SHG es utilizada eficazmente en la modelización de diferentes tipos de datos.

Las ecuaciones de verosimilitud para la SHG son insolubles y resolverlas por iteración puede ser problemático [2],[3],[4]. Si los datos contienen valores atípicos, las iteraciones con las ecuaciones de verosimilitud son a

menudo no convergentes [5]. Para mitigar estas dificultades, se puede utilizar el método de Máxima Verosimilitud Modificada (MVM) [6],[7], donde los estimadores obtenidos, tienen formas algebraicas explícitas y son, por lo tanto, fáciles para calcular y se sabe que tienen las siguientes propiedades bajo las condiciones de regularidad habituales para la existencia de los estimadores de Máxima Verosimilitud (MV):

- (a) asintóticamente, los estimadores de MVM son totalmente eficientes, es decir, son insesgados y sus varianzas son iguales [8],[9],[4] a los Límites de Varianza Mínima (LVM);
- (b) para muestras pequeñas, los estimadores de MVM son casi totalmente eficientes en cuanto a los LVM [3];
- (c) las estimaciones tienen poco o ningún sesgo.

En este sentido, este trabajo tiene como objetivo presentar un estudio del modelo lineal clásico con el supuesto de la distribución SHG de error, y emplear el método de estimación de MVM para diferentes tipos de datos.

## 2 Metodología

### 2.1 Distribución Secante Hiperbólica Generalizada.

Sea un modelo de regresión lineal simple

$$y_i = \theta_0 + \theta_1 x_i + e_i \quad 1 \leq i \leq n.$$

Suponga que  $e_i$  son idd, y tiene una distribución SHG(0,  $\sigma$ ;  $t$ )

$$f(e) = \frac{c_1}{\sigma} \frac{\exp(c_2(e/\sigma))}{\exp(2c_2(e/\sigma)) + 2a \exp(c_2(e/\sigma)) + 1} \quad (-\infty < e < \infty) \quad (1)$$

donde para  $-\pi < t < 0$ ,

$$a = \cos(t), \quad c_2 = \sqrt{\frac{(\pi^2 - t^2)}{3}} \quad y \quad c_1 = \frac{\sin t}{t} c_2,$$

para  $t = 0$

$$a = 1, \quad c_1 = c_2 = \frac{\pi}{\sqrt{3}},$$

y para  $t > 0$

$$a = \cosh t, \quad c_2 = \sqrt{\frac{(\pi^2 + t^2)}{3}} \quad y \quad c_1 = \frac{\sinh t}{t} c_2.$$

La media y varianza son:

$$E(e) = 0, \quad y \quad Var(e) = 1.$$

Sea  $z_i = e_i/\sigma = (y_i - \theta_0 - \theta_1 x_i)/\sigma$ ,  $1 \leq i \leq n$ , las ecuaciones de verosimilitud  $\partial \ln L / \partial \theta_0 = 0$ ,  $\partial \ln L / \partial \theta_1 = 0$  y  $\partial \ln L / \partial \sigma = 0$  son funciones no lineales. Para derivar las ecuaciones de verosimilitud modificada que tienen soluciones explícitas, y están en condiciones de regularidad asintóticamente equivalentes a las ecuaciones de verosimilitud (Smith [10]), primero se ordena  $w_i = y_i - \theta_1 x_i$  (para un determinado  $\theta_1$ )

$$w_{(1)} \leq w_{(2)} \leq \dots \leq w_{(n)}; \quad w_{(i)} = y_{[i]} - \theta_1 x_{[i]}.$$

Definiendo las variables aleatorias ordenadas como  $z_{(i)} = (w_{(i)} - \theta_0)/\sigma$ , y denotando por  $(y_{[i]}, x_{[i]})$  la pareja ordenada que determina el valor de  $w_{(i)}$ ;  $(y_{[i]}, x_{[i]})$  puede ser llamado el concomitante de  $z_{(i)}$ . El hecho de que las sumas completas son invariantes al orden, implica que las ecuaciones de verosimilitud se puede escribir en términos de  $z_{(i)}$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_0} = -\frac{c_2 n}{\sigma} + \frac{2c_2}{\sigma} \sum_{i=1}^n g(z_{(i)}) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_1} = -\frac{c_2}{\sigma} \sum_{i=1}^n x_{[i]} + \frac{2c_2}{\sigma} \sum_{i=1}^n x_{[i]} g(z_{(i)}) = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} - \frac{c_2}{\sigma} \sum_{i=1}^n z_{(i)} + \frac{2c_2}{\sigma} \sum_{i=1}^n z_{(i)} g(z_{(i)}) = 0, \quad (4)$$

donde

$$g(z_{(i)}) = (\exp(2c_2z_{(i)}) + a \exp(c_2z_{(i)})) / \exp(2c_2z_{(i)}) + 2a \exp(c_2z_{(i)}) + 1.$$

Las ecuaciones (2), (3) y (4) no admiten soluciones explícitas a causa de los términos relacionados con la función no lineal  $g(z_{(i)})$ .

## 2.2 Verosimilitud Modificada

Sea  $t_{(i)} = E(z_{(i)})$  el valor esperado de la  $i$ -ésima estadística de orden  $z_{(i)}$ , ( $1 \leq i \leq n$ ). Note que las expresiones para encontrar los valores exactos de las esperanzas  $t_{(i)}$  están disponible en Vaughan [1], pero son difíciles de implementar. Por lo tanto, se utiliza valores aproximados para los  $t_{(i)}$  presentados en Tiku, Aysen y Akkaya [4] y que permiten minimizar las operaciones realizadas en la programación del método:

$$t_{(i)} = \begin{cases} \frac{1}{c_2} \ln \left( \frac{\sin(tq_i)}{\sin(t(1-q_i))} \right), & \text{si } -\pi < t < 0; \\ \frac{\sqrt{3}}{\pi} \ln \left( \frac{q_i}{1-q_i} \right), & \text{si } t = 0; \\ \frac{1}{c_2} \ln \left( \frac{\sinh(tq_i)}{\sinh(t(1-q_i))} \right), & \text{si } t > 0, \end{cases} \quad (5)$$

donde  $q_i = i/(n + 1)$ , que son las soluciones de

$$\int_{-\infty}^{t_{(i)}} f(z) = q_i.$$

Para obtener las ecuaciones de verosimilitud modificada, se tiene que linealizar  $g(z_{(i)})$ , mediante el uso de los dos primeros términos de una expansión de la serie de Taylor alrededor de  $t_{(i)}$  (Tiku [7]; Tiku y Suresh [6]).

$$\begin{aligned} g(z_{(i)}) &\cong g(t_{(i)}) + g'(t_{(i)})(z_{(i)} - t_{(i)}) \\ &= \alpha_i + \beta_i z_{(i)}, \quad 1 \leq i \leq n, \end{aligned} \quad (6)$$

donde  $\alpha_i = g(t_{(i)}) - \beta_i t_{(i)}$  y  $\beta_i = g'(t_{(i)})$ . Cuando  $\beta_i < 0$ , se establece que  $\beta_i = 0$  [1]. Por lo tanto,  $\hat{\sigma}$  siempre es real y positiva. Además note que,

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = n/2 \text{ y } \sum_{i=1}^n \beta_i t_{(i)} = 0.$$

La incorporación de la expresión (6) en (2)-(4), se obtiene las ecuaciones de verosimilitud modificada  $\partial \ln L^*/\partial \theta_0 = 0$ ,  $\partial \ln L^*/\partial \theta_1 = 0$  y  $\partial \ln L^*/\partial \sigma = 0$ . las soluciones de estas ecuaciones son los estimadores de *MVM*:

$$\hat{\theta}_0 = \bar{y}_{[.]} - \hat{\theta}_1 \bar{x}_{[.]}, \quad (7)$$

$$\hat{\theta}_1 = K - \hat{\sigma} D, \quad (8)$$

y

$$\hat{\sigma} = \left\{ -B + \sqrt{B^2 + \frac{4nC}{c_2}} \right\} \div \frac{2n}{c_2} \quad (9)$$

donde

$$\bar{x}_{[.]} = \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i x_{[i]}}{\sum_{i=1}^n \beta_i}, \quad \bar{y}_{[.]} = \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i y_{[i]}}{\sum_{i=1}^n \beta_i}$$

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i (x_{[i]} - \bar{x}_{[.]}) y_{[i]}}{\sum_{i=1}^n \beta_i (x_{[i]} - \bar{x}_{[.]})^2}, \quad D = \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_{[i]} - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_{[i]}}{\sum_{i=1}^n \beta_i (x_{[i]} - \bar{x}_{[.]})^2}$$

$$B = \sum_{i=1}^n y_{[i]} - K \sum_{i=1}^n x_{[i]} - 2 \sum_{i=1}^n \alpha_i y_{[i]} + 2K \sum_{i=1}^n \alpha_i x_{[i]}$$

$$C = 2 \left( \sum_{i=1}^n \beta_i (y_{[i]} - \bar{y}_{[.]})^2 - K \sum_{i=1}^n \beta_i (x_{[i]} - \bar{x}_{[.]}) y_{[i]} \right)$$

### 2.3 Determinación del parámetro de forma

Se procede a calcular los valores de  $\hat{\theta}_0$ ,  $\hat{\theta}_1$  y  $\hat{\sigma}$  de las ecuaciones (7), (8) y (9) para un  $t$  dado. Ahora, se obtienen los valores de  $(1/n) \ln L$  utilizando alguna de las siguientes expresiones de acuerdo al  $t$  elegido, para  $-\pi < t < 0$

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \ln L = & \ln \left( \frac{\sin t}{\widehat{\sigma}_m t} \sqrt{\frac{\pi^2 - t^2}{3}} \right) + \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi^2 - t^2}{3}} \sum_{i=1}^n \widehat{z}_i \\ & - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left[ \exp \left( 2 \sqrt{\frac{\pi^2 - t^2}{3}} \widehat{z}_i \right) + 2 \cos t \exp \left( \sqrt{\frac{\pi^2 - t^2}{3}} \widehat{z}_i \right) + 1 \right], \end{aligned} \quad (10)$$

y, cuando  $t > 0$

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \ln L = & \ln \left( \frac{\sinh t}{\widehat{\sigma}_m t} \sqrt{\frac{\pi^2 + t^2}{3}} \right) + \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi^2 + t^2}{3}} \sum_{i=1}^n \widehat{z}_i \\ & - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left[ \exp \left( 2 \sqrt{\frac{\pi^2 + t^2}{3}} \widehat{z}_i \right) + 2 \cosh t \exp \left( \sqrt{\frac{\pi^2 + t^2}{3}} \widehat{z}_i \right) + 1 \right], \end{aligned} \quad (11)$$

donde  $\widehat{z}_i = (y_i - \widehat{\theta}_0 - \widehat{\theta}_1 x_i) / \widehat{\sigma}$ . Se realiza este procedimiento para una serie de valores de  $t$ . El valor de  $t$  que maximiza  $\ln L$  es la estimación requerida [11],[12].

## 2.4 Mínimos Cuadrados

No hay supuestos de distribución como tal, en la aplicación de la metodología de Mínimos Cuadrados (MC). Bajo el supuesto de que  $e_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) son iid, los estimadores MC se obtienen mediante la minimización del error Suma de Cuadrados (SC)

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \theta_0 - \theta_1 x_i)^2.$$

Los estimadores  $\widehat{\theta}_0$  y  $\widehat{\theta}_1$  resultante, bajo el supuesto de normalidad  $N(0, \sigma^2)$  son exactamente los mismos que los estimadores de MV. Los estimadores de MC de  $\sigma^2$  es definido como:

$$\widetilde{\sigma}^2 = \min \sum_{i=1}^n e_i^2 / (n - r)$$

$$= \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y} - \tilde{\theta}_1(x_i - \bar{x}))^2 / (n - 2)$$

donde  $r$  es el número de parámetros estimados, además de  $\sigma$ .

Bajo el supuesto de normalidad, los estimadores de  $MC$  poseen todas las propiedades deseables. Sin embargo, tienen bajas eficiencias para distribuciones no normales.

## 2.5 Mínimos Cuadrados Ponderados.

Supongamos que los errores aleatorios  $e_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) en el modelo de regresión lineal simple, se distribuyen de forma independiente con una media común  $E(e_i) = a\sigma$  y varianza  $Var(e_i) = V_i\sigma^2$ . Sea  $w_i = 1/V_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ). Los estimadores de MC ponderados de  $\theta_0$  y  $\theta_1$  se obtienen mediante la minimización de

$$\sum_{i=1}^n w_i e_i^2 = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - \theta_0 - \theta_1 x_i)^2.$$

Esto da

$$\tilde{\theta}_1 = \sum_{i=1}^n w_i (x_i - \bar{x}) y_i / \sum_{i=1}^n w_i (x_i - \bar{x})^2, \quad \tilde{\theta}_0 = \bar{y} - \tilde{\theta}_1 \bar{x} \quad (12)$$

y

$$\tilde{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - \bar{y} - \tilde{\theta}_1 (x_i - \bar{x}))^2 / (n - 2), \quad (13)$$

donde  $\bar{y} = \sum_{i=1}^n w_i y_i / (\sum_{i=1}^n w_i)$  y  $\bar{x} = \sum_{i=1}^n w_i x_i / (\sum_{i=1}^n w_i)$ .

## 2.6 Mínimos Cuadrados para la Secante Hiperbólica Generalizada

Suponiendo la distribución SHG para los errores, los estimadores de MC son de (12)-(13):

$$\tilde{\theta}_0 = \bar{y} - \tilde{\theta}_1 \bar{x}, \quad \tilde{\theta}_1 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) y_i / \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (14)$$



y

$$\tilde{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y} - \tilde{\theta}_1(x_i - \bar{x}))^2 / (n - 2), \tag{15}$$

donde  $\bar{y} = \sum_{i=1}^n y_i/n$  y  $\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i/n$ .

### 3 Aplicación

Se implementa computacionalmente el parámetro de forma y los estimadores obtenidos por MVM, mediante la programación de las expresiones en el software libre R.

**Ejemplo 3.1.** En Hamilton [13] se tiene un conjunto de datos interesantes sobre las magnitudes y los rendimientos de 19 pruebas de armas soviéticas;  $Y$  representa la magnitud estimada de los sismólogos y  $X$  el rendimiento reportado en kilotones (Tabla 1).

**Tabla 1:** Datos


X:	29	125	100	4	10	60	10	125	40	90
Y:	5,6	6,1	6,0	4,8	5,2	5,8	5,4	6,0	5,7	5,9
X:	16	12	23	16	6	8	2	165	140	
Y:	5,5	5,3	5,5	5,4	5,1	5,0	4,9	6,1	6,0	

Se procede a calcular el parámetro de forma apropiado para el conjunto de datos, mediante las ecuaciones (10) y (11), se tiene los siguientes valores de  $(1/n) \ln L$  (Tabla 2).

**Tabla 2:** Valores de  $(1/n) \ln L$

$t$	$-\pi\sqrt{2/3}$	$-\pi\sqrt{1/2}$	$-\pi\sqrt{1/9}$	2,7	2,8	3	$\pi$
	-0,551	-0,116	0,121	0,2346	0,2348	0,2339	0,2321

Un gráfico Cuantil-Cuantil de los residuos estimados Figura 1. Indican que una distribución de la familia (1) con  $t = 2,7$  puede proporcionar un modelo plausible.



**Figura 1:** Gráfico Cuantil-Cuantil (SHG).

Las estimaciones de  $MC$  son:

$$\tilde{\theta}_0 = 5,190, \quad \tilde{\theta}_1 = 0,00682 \quad y \quad \tilde{\sigma} = 0,200.$$

Las estimaciones de máxima verosimilitud modificada de  $\theta_0$ ,  $\theta_1$  y  $\sigma$  bajo la suposición del modelo de la  $SHG$  con el valor de  $t = 2,7$  son:

$$\hat{\theta}_0 = 5,138, \quad \hat{\theta}_1 = 0,00725 \quad y \quad \hat{\sigma} = 0,207.$$

**Ejemplo 3.2.** En Hand [14] se muestra una serie de datos interesantes. Se tiene  $n = 30$  observaciones sobre  $(X, Y)$ :  $X$  indica la temperatura exterior media en grados Celsius e  $Y$  el consumo de gas (1000 pies cúbicos). Las observaciones fueron tomadas durante un período de 30 semanas después de la aislamiento de la cámara.

**Tabla 3:** Datos


X:	-0,7	0,8	1,0	1,4	1,5	1,6	2,3	2,5	2,5	3,1
Y:	4,8	4,6	4,7	4,0	4,2	4,2	4,1	4,0	3,5	3,2
X:	3,9	4,0	4,0	4,2	4,3	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9
Y:	3,9	3,5	3,7	3,5	3,5	3,7	3,5	3,4	3,7	4,0
X:	5,0	5,3	6,2	7,1	7,2	7,5	8,0	8,7	8,8	9,7
Y:	3,6	3,7	2,8	3,0	2,8	2,6	2,7	2,8	1,3	1,5

A continuación se presenta una serie de valores de  $(1/n) \ln L$  para cada  $t$  dado.

**Tabla 4:** Valores de  $(1/n) \ln L$

$t$	$-\pi\sqrt{2/3}$	$-\pi/9$	2	2,1	2,9	$\pi$	$5\pi$
	-0,869	-0,788	-0,359	-0,353	-0,368	-0,386	-1,363

Unos gráficos Cuantil - Cuantil de los residuos estimados para el modelo de regresión lineal simple presentados la Figura 2, indica que una distribución en la familia (1) con  $t = 2,1$  puede proporcionar un modelo plausible.



**Figura 2:** Gráfico Cuantil-Cuantil (SHG).

Los estimadores correspondientes  $MC$  y  $MVM$


$$\tilde{\theta}_0 = 4,724, \quad \tilde{\theta}_1 = -0,278 \quad \tilde{\sigma} = 0,355.$$

$$\hat{\theta}_0 = 4,616, \quad \hat{\theta}_1 = -0,251 \quad y \quad \hat{\sigma} = 0,323.$$

**Ejemplo 3.3.** Se midió la altura (*cm*) y peso (*kg*) de 30 niñas de once años de edad que asisten a la escuela secundaria de Heaton, Bradford [14, pag. 75].

**Tabla 5:** Datos

Altura (cm) x	Peso (kg) y	Altura (cm) x	Peso (kg) y	Altura (cm) x	Peso (kg) y
135	26	141	28	149	46
146	33	136	28	147	36
153	55	154	36	152	47
154	50	151	48	140	33
139	32	155	36	143	42
131	25	133	31	148	32
149	44	149	34	149	32
137	31	141	32	141	29
143	36	164	47	137	34
146	35	146	37	135	30



**Figura 3:** Gráfico Cuantil-Cuantil (SHG).

Una gráfica Cuantil - Cuantil de los residuos estimados para el modelo de regresión lineal dada la Figura 3, indica que una distribución de la familia (1) con  $t = 2$  puede proporcionar un modelo plausible. Los estimadores

correspondientes de MVM y MC se indican a continuación:

$$\hat{\theta}_0 = -69,372, \quad \hat{\theta}_1 = 0,729 \quad y \quad \hat{\sigma} = 5,348.$$

$$\tilde{\theta}_0 = -71,370, \quad \tilde{\theta}_1 = 0,743 \quad \tilde{\sigma} = 5,248.$$

## 4 Conclusiones

Es ampliamente reconocido que las distribuciones no normales, ocurren con tanta frecuencia en la práctica e incluso que las muestras contienen a menudo valores atípicos. En tales situaciones, la estimación de máxima verosimilitud puede ser problemática [5]. En este trabajo, se ha utilizado el método de verosimilitud modificada para estimar los parámetros de un modelo de regresión lineal con el supuesto de la distribución SHG de error. Los estimadores resultantes, son funciones explícitas de observaciones de la muestra y, por tanto, fácil de calcular. Este enfoque fue implementado computacionalmente utilizando software simple y accesible como R.

El análisis efectuado en los tres ejemplos, muestra que la SHG con  $t$  adecuado, proporciona un modelo plausible frente a las distribuciones subyacentes de los datos.

## Agradecimientos

Los autores agradecen a los pares evaluadores y editores de la revista por sus valiosas contribuciones. Adicionalmente, a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá por su aporte significativo a este trabajo.

## Referencias

- [1] D. C. Vaughan, “The Generalized Secant Hyperbolic Distribution And Its Properties,” *Communications in statistics*, vol. 31, no. 2, pp. 219–238, 2002. 38, 41
- [2] V. D. Barnett, “Evaluation of the maximum likelihood estimator when the likelihood equation has multiple roots,” *Biometrika*, vol. 53, pp. 151–165, 1996a. 38

- [3] D. C. Vaughan, “On the Tiku-Suresh method of estimation,” *Communications in statistics*, vol. 21, pp. 451–469, 1992. 38, 39
- [4] M. L. Tiku, D. Aysen, and Akkaya, *Robust Estimation and Hypothesis Testing*, 2nd ed. New York: New Age, 2004. 38, 39, 41
- [5] S. Puthenpura and N. K. Sinha, “Modified maximum likelihood method for the robust estimation of system parameters from very noisy data,” *Automatica*, vol. 22, pp. 231–235, 1986. 39, 49
- [6] M. L. Tiku and R. P. Suresh, “A new method of estimation for location and scale parameters,” *J. Stat. Plann*, vol. 30, pp. 281–292, 1992. 39, 41
- [7] M. L. Tiku, “Estimating the mean and Standard Deviation from a censored Normal Sample,” *Biometrika*, vol. 54, no. 1, pp. 155–165, 1967a. 39, 41
- [8] —, “Monte Carlo Study of Some Simple Estimators in Censored Normal Samples,” *Biometrika*, vol. 57, pp. 207–211, 1970. 39
- [9] G. K. Bhattacharyya, “The Asymptotics of Maximum Likelihood and Related Estimators Based on Type II Censored data,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 80, no. 390, pp. 398–404, 1970. 39
- [10] R. L. Smith, “Maximum likelihood estimation in a class of nonregular cases,” *Biometrika*, no. 72, pp. 67–90, 1985. 40
- [11] M. L. Tiku, W. K. Wong, D. C. Vaughan, and G. Bian, “Time series models in non-normal situations: symmetric innovations,” *J. Time Series Analysis*, vol. 21, pp. 571–596, 2000. 43
- [12] M. Alejandro and B. Alexander, “Secante hiperbolica generalizada y un metodo de estimacion de sus parametros: maxima verosimilitud modificada,” *Ingenieria y Ciencia*, vol. 9, no. 18, pp. 93–106, 2013. 43
- [13] L. Hamilton, *Regression With Graphics*, 1st ed. Brooks/Cole Publishing Company, 1992. 45
- [14] D. Hand, F. Daly, A. Lunn, K. McConway, and E. Ostrowski, *Small Data Sets*, 1st ed. Springer-Science Business, 1994. 46, 48